



# MASTERCID MICROPYR

## INSETTICIDA CONCENTRATO MICROINCAPSULATO

### Composizione

<b>Cipermetrina</b>	10 %
<b>Estratto di piretro 50 %</b>	2.0 %
<b>PBO</b>	6.0 %

### PMC (PT18)

AUTORIZZAZIONE DEL  
MINISTERO DELLA SALUTE n.  
**20546**

### Organismi target:

Insetti volanti e striscianti

### Imballi disponibili:

12 flaconi da 1 litro

### CODICE

<b>048-1</b> <b>037-05</b>	<b>1 litro</b> <b>5 litri</b>
-------------------------------	----------------------------------

### CODICE

<b>Insetti volanti</b>	5-10 ml in 1 litro
<b>Mosche</b>	10 ml / litro
<b>Insetti striscianti</b>	50-100 ml in 10 litri
<b>Blatte</b>	100 ml/ 10 litri
<b>cimici dei letti</b>	100 ml/ 10 litri

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

MASTERCID MICROPYR è un insetticida-acaricida concentrato microincapsulato in base acquosa, a largo spettro d'azione e lunga persistenza.

I due principi attivi contenuti nella formulazione, sinergizzati dal piperonil butossido, rendono il prodotto fortemente abbattente e nello stesso tempo molto residuale (cipermetrina).

La residualità è inoltre rafforzata dalla microincapsulazione di entrambi i principi attivi che, con questa tecnica, sono racchiusi in microcapsule e rilasciati lentamente.

La doppia azione conferisce a MASTERCID MICROPYR la proprietà di eliminare gli insetti presenti al momento del trattamento ed evitare l'insorgere di successive infestazioni per almeno **1-2 settimane**.

MASTERCID MICROPYR è indicato nella lotta contro una larga varietà di insetti:

insetti volanti quali zanzara tigre, mosca domestica, cimici ecc., e insetti striscianti quali blatte, formiche, acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae*) ecc.

### Il prodotto è inoltre attivo contro le cimici dei letti.

MASTERCID MICROPYR può essere vantaggiosamente impiegato nella disinfestazione di fabbricati a uso civile, industriale, zootecnico, agglomerati urbani, aree suburbane, abitazioni, scuole e asili, caserme, palestre, teatri, cinema, sale d'attesa di stazioni e aeroporti, villaggi turistici, aziende alimentari, campeggi, mense, ristoranti, alberghi, ospedali, case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di merci alimentari, stalle, allevamenti e ricoveri per animali, magazzini e locali destinati alla produzione e stivaggio di sigarette e tabacchi, ambienti industriali in genere, zone e attrezzature portuali, mezzi di trasporto (escluso aereo).

L'uso sul verde quali giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi, viali alberati e aree verdi pubbliche e private, è consigliato per il controllo delle zanzare.

### MODO D'USO

MASTERCID MICROPYR si può distribuire con pompe a pressione, manuali o elettriche, atomizzatori, nebulizzatori ecc. in ragione di 1 litro di soluzione ogni 10-15 m<sup>2</sup> di superficie.

- Ambienti interni: spruzzare in particolar modo le aree perimetrali dei locali, i battiscopa, gli angoli e le fessure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia riscontrabile la presenza o il passaggio degli insetti.

Contro gli insetti volanti trattare le superfici dove tendono a sostare.



Revisione

01/08/2024



# MASTERCID MICROPYR

## INSETTICIDA CONCENTRATO MICROINCAPSULATO

Negli allevamenti, allontanare gli animali prima del trattamento ed arieggiare i locali prima di reintrodurli.

- **All'esterno:** applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiuti.

Al fine di prevenire la re-infestazione degli ambienti interni, si consiglia di spruzzare il prodotto lungo tutto il perimetro esterno fino a un metro di distanza e i muri fino a un'altezza di circa 1 metro.

### DOSAGGIO

- **Insetti volanti:** diluire 5-10 ml per litro d'acqua (0,5-2%) secondo l'entità dell'infestazione.

La dose maggiore è indicata per il controllo delle mosche.

Nel trattare le aree verdi per il controllo delle zanzare si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.

- **Insetti striscianti e cimici dei letti:** diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 ml 10 litri d'acqua) secondo l'entità dell'infestazione e dell'insetto da combattere.

La dose più alta è indicata per il trattamento delle blatte, cimici dei letti e per il trattamento su superfici assorbenti. Non superare le dosi consigliate.

- MASTERCID MICROPYR può anche essere miscelato al 3-5% con acqua (300-500 ml in 10 litri di acqua) per impieghi con apparecchi nebulizzatori (nebbie fredde) o tramite termonebulizzatori (nebbie calde) in ragione di 0,5-1 litro di soluzione per ettaro di superficie o 0,5-2 per 1000 m<sup>3</sup> di ambiente.

L'utilizzo di MASTERCID MICROPYR attraverso attrezzature particolari (es. nebbiogeni) è consentito ai soli utilizzatori professionali.

### AVVERTENZE:

Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Nel caso di trattamenti zootecnici, allontanare gli animali durante il trattamento. Non impiegare in agricoltura.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Azione farmaco-dinamica dei principi attivi: blocco della trasmissione nervosa. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.