



Revisione 04/09/2024



PROXILAR®

LARVICIDA PRONTO USO IN COMPRESSE

Composizione

Piriproxifen puro	0,5 g
Denatonio Benzoato	0,001 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

Organismi target:

Stadi larvali delle zanzare

Confezione:

barattolino da 10 g (10 compresse)

CODICE

625

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PRODOTTO BIOCIDA (PT18) AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. IT/2018/00486/AUT

Insetticida in compresse effervescenti a rapido rilascio del peso di 1 g.

La presenza dell'amaricante Denatonio Benzoato riduce i rischi di ingestione accidentale da parte di bambini o di persone inconsapevoli.

INFESTANTI BERSAGLIO:

PROXILAR® è appositamente formulato per il controllo degli stadi larvali delle zanzare (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*, *Ochlerotatus caspius*...) grazie all'azione svolta dal principio attivo Piriproxifen, insetticida regolatore della crescita, non pericoloso per i vertebrati.

AMBIENTI D'USO:

PROXILAR® è idoneo al trattamento di tombini, caditoie, bocche di lupo, ristagni in genere.

DOSI CONSIGLIATE:

Dosi consigliate

Per ogni Tombino o caditoia	1 compressa da 1 g (si stima un contenuto massimo di 20 litri d'acqua per tombino).
Altri tipi di ristagno	2 compresse da 1 g ogni 40 litri di acqua

Per il corretto rilascio del principio attivo è necessario che la compressa venga a contatto con l'acqua stagnante presente nel focolaio.

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Dopo 24 ore dal rilascio la maggior parte delle larve di zanzara subisce una contaminazione irreversibile che ne impedirà la completa trasformazione in zanzara adulta alata. La morte subentra allo stadio di pupa. Per un controllo continuativo della popolazione di zanzare si consiglia l'applicazione di una compressa ogni 2-3 settimane. L'azione del Piriproxifen non è influenzata dalla presenza di carica organica nelle acque infestate.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

NOTE:

Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego