



Revisione

11/05/2024



# TIGER 25 BLOCK®

## RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI A BASE DI BRODIFACOUM 0,0025%

### COMPOSIZIONE

<b>Brodifacoum puro (N° CAS 56073-10-0)</b>	0,0025 g
<b>Denatonio Benzoato (N° CAS 3734-33-6)</b>	0,001 g
<b>Sostanze appetibili e coformulanti</b>	qb. a 100 g

**PRODOTTO BIOCIDA (PT14)**  
AUTORIZZAZIONE DEL  
MINISTERO DELLA SALUTE n.  
IT/2022/00815/AUT

### CODICE

<b>162-TIG25X300</b>	300 g.
----------------------	--------

### Imballi disponibili:

24 buste da 300 g.

### Da usare con:

box erogatori di sicurezza

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIGER 25 BLOCK è un rodenticida pronto all'uso a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce efficacemente contro topi e ratti con una sola ingestione. La morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione permettendo il controllo dell'infestazione, senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia.

TIGER 25 BLOCK contiene una miscela ben bilanciata di ingredienti di origine alimentare appetibili per i roditori.

TIGER 25 BLOCK può essere impiegato per derattizzazioni interne ed intorno agli edifici.

TIGER 25 BLOCK contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte dei bambini.

### MODO D'USO:

#### Uso all'interno di edifici per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*):

Posizionare 20-40 g di TIGER 25 BLOCK per contenitore, pari a 1-2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 2-4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.

Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori.

Quando necessario reintegrare l'esca. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

#### Uso all'interno di edifici per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*):

Posizionare 100-200 g di TIGER 25 BLOCK per contenitore, pari a 5-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.



Revisione

11/05/2024



## TIGER 25 BLOCK

RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI A  
BASE DI BRODIFACOUM 0,0025%

### Uso all'esterno, intorno agli edifici Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*):

Posizionare 100-200 g di TIGER 25 BLOCK per contenitore, pari a 5-10 esche in blocchi pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 10-20 esche in blocchi pronti all'uso da 10 g ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti.

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori.

Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

### NOTE:

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente.

Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non ingerire. Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere fuori dalla portata degli animali domestici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi con acqua e sapone. Le esche devono essere disposte all'interno di adeguati contenitori con l'accesso solo per i roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di animali non bersaglio.

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per l'utilizzo in aree pubbliche segnalare presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il prodotto e indicare le misure di primo soccorso.

I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse devono essere adeguatamente smaltite.

