



REVISIONE 2026

## BIO-Dust®

INSETTICIDA IN POLVERE

**BIO-Dust®** è un insetticida in polvere pronto all'uso, a base di Cipermetrina, che si caratterizza per il suo elevato potere abbattente e snidante. Indicato per il controllo di insetti striscianti, come blatte e formiche, e per l'eliminazione diretta di nidi di vespe, è ideale per l'applicazione in crepe, fessure, vuoti e cavità, dove gli insetti tendono a rifugiarsi. Il prodotto contiene un amaricante (Denatonio benzoato) per ridurre il rischio di ingestione accidentale. Nel formato da 1 Kg **BIO-Dust®** è indicato per utilizzo esclusivamente professionale.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**BIO-Dust®** può essere utilizzato per interventi di disinfestazione in ambienti chiusi come locali domestici, nello specifico dietro/sotto frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno, sotto lo scaldabagno, all'interno di crepe, fessure, vuoti e cavità, e ancora in presenza di nidi di vespe in ambiente chiuso.

N° Reg: IT/2023/00917/BBS

### ORGANISMI TARGET



Blatte



Formiche



Vespe

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina **0,25 %**  
Denatonio Benzoato **0,001 %**

### FORMULAZIONE

Polvere

### CODICE

077-250      250 g  
077            1 Kg

### IMBALLI

12 Pcs.      250 g      Flacone con spargitore  
12 Pcs.      1 Kg        Flacone con spargitore



### MODALITÀ DI UTILIZZO

#### APPLICAZIONE IN CREPE E FESSURE, VUOTI E CAVITÀ CONTRO GLI INSETTI STRISCANTI

In ambienti chiusi, nei luoghi in cui gli insetti si nascondono. L'applicazione deve essere eseguita alla dose consigliata. Le persone incaricate della pulizia delle aree trattate devono essere informate dall'utilizzatore professionale delle misure di mitigazione del rischio, per garantire che il prodotto non entri nella rete fognaria.

**Metodo di applicazione:** applicazione manuale.

Il prodotto va applicato solo in zone ristrette di superfici non regolarmente pulite, ad esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure che possono essere rifugio di scarafaggi e formiche. L'applicazione (spolveratura) deve essere eseguita utilizzando il contenitore munito di apposito spargitore (ove disponibile) o un'attrezzatura professionale per l'applicazione della polvere.



#### **APPLICAZIONE PER USO AMATORIALE (flacone 250 g):**

##### **Applicazione contro i nidi di formiche - All'aperto. All'esterno, sul nido.**

L'applicazione deve essere eseguita alla dose consigliata di 8 g/m<sup>2</sup>.

Per flaconi con spargitore: Agitare delicatamente la confezione, rimuovere il tappo e capovolgere il flacone. Per trattare una superficie di un metro quadrato, capovolgere il flacone 3 volte, muovendosi nell'area da trattare, rilasciando una dose totale di 5 g per metro quadrato.

Per flaconi con dosatore di precisione: agitare delicatamente la confezione, ruotare la tazza e capovolgere la bottiglia. Per trattare una superficie di un metro quadrato, spremere leggermente il flacone per 2 secondi, muovendosi nell'area da trattare, rilasciando una dose totale di 5 g per metro quadrato. Eseguire una singola applicazione per nido. Una singola applicazione può eliminare completamente la colonia. Se le formiche utilizzano più fori di ingresso, la quantità totale di polvere (5 g) deve essere divisa per il numero di ingressi (ad esempio se sul nido sono presenti 5 ingressi applicare 1 g di prodotto/ingresso).

##### **Applicazione a spot intorno agli edifici contro *Blatta orientalis* - All'aperto. All'esterno, intorno agli edifici, nei pressi di finestre e porte.**

L'applicazione deve essere eseguita alla dose consigliata, in prossimità di finestre e porte.

Per flaconi con spargitore: Agitare delicatamente la confezione, rimuovere il tappo e capovolgere il flacone. Per trattare una superficie di un metro quadrato, capovolgere il flacone 5 volte, muovendosi nell'area da trattare, rilasciando una dose totale di 8 g per metro quadrato.

Per flaconi con dosatore di precisione: agitare delicatamente la confezione, ruotare la tazza e capovolgere la bottiglia. Per trattare una superficie di un metro quadrato, spremere leggermente il flacone per 3 secondi, muovendosi nell'area da trattare, rilasciando una dose totale di 8 g per metro quadrato. L'applicazione deve essere eseguita solo in aree coperte (protette dalla pioggia). L'abbattimento degli scarafaggi orientali è previsto 4 ore dopo l'esposizione alle superfici trattate. Vedere anche le istruzioni generali per l'uso.

#### **APPLICAZIONE PER USO PROFESSIONALE (flacone da 1 kg):**

##### **Applicazione in crepe e fessure, vuoti e cavità contro gli insetti striscianti. Ambiente chiuso.**

L'applicazione deve essere eseguita alla dose consigliata di 8 g/m<sup>2</sup>.

#### **AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO**

Leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto prima dell'uso.