REVISIONE 2026

Delta **PBO®**

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO

Delta PBO® è un insetticida in sospensione concentrata a base di Deltametrina con potere snidante ed abbattente ad elevata residualità. Il piperonil butossido contenuto nella formula esalta l'abbattenza e favorisce la penetrazione della Deltametrina all'interno del corpo dell'insetto.

Grazie a queste sue caratteristiche, **Delta PBO®** è ideale anche per contrastare le infestazioni di quei ceppi di insetti che hanno manifestato fenomeni di resistenza ai piretroidi di sintesi non sinergizzati. **Delta PBO®** è indicato per la lotta agli insetti volanti e striscianti quali blatte, formiche, cimici, pulci, punteruoli, tarme, tarli, tignole, zanzara comune e tigre, mosche e chironomidi.

N° Registrazione: 19903

ORGANISMI TARGET

Zanzare Mosche Blatte

zanzara tigre - chironomidi - formiche - cimici - pulci - tarli tarme - punteruoli - tarli

COMPOSIZIONE

Deltametrina **2,5 %**Piperonil butossido **1,0 %**

DILUIZIONE

TARGET	ml prodotto /m²	%
Zanzare	0,05	0,5
Mosche	0,5	0,5
Insetti striscianti	0,6	0,6

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

CODICE

058-01 1 L
058-05 5 L

IMBALLI

6 Pz. 1 L Flacone
2 Pz. 5 L Tanica

CAMPI DI **APPLICAZIONE**

Delta PBO® risulta efficace già a dosaggi contenuti e permette di raggiungere elevati standard di attività in ambiti domestici e civili, quali insediamenti industriali e zootecnici (abitazioni, industrie alimentari, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, mezzi di trasporto, allevamenti, stalle, ricoveri di animali, cucce, concimaie, depositi di rifiuti).

Inoltre, può essere impiegato in aree verdi urbane, pubbliche e private per il controllo delle zanzare.

ORMA
Sede ORMA S.r.l. Via A. Chiribiri 2 Trofarello (TO) - 10028 Italia
T. +39 011 64 99 064 www.ormatorino.com

MODALITÀ DI UTILIZZO

Delta PBO® si impiega diluito in acqua alle seguenti dosi:

- **Contro insetti volanti:** (mosche, zanzare, chironomidi, tignole, ecc.): diluire 3 - 5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,3 - 0,5 %). Con un litro di soluzione ottenuto, trattare 10 m^2 di superficie. Per trattamenti su concimaie e simili, elevare la dose a 0,6 %.

- **Contro insetti striscianti:** (blatte, formiche, cimici, pulci, tarme, tarli): diluire 5 - 6 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,5 - 0,6 %); con un litro di soluzione ottenuta trattare 10 m^2 di superficie.

- **Per trattamenti all'aperto:** (giardini, viali alberati, siepi, tappeti erbosi): diluire 5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,5 %). Distribuire la soluzione ottenuta, utilizzando atomizzatori a medio - basso volume o altre idonee attrezzature in ragione di 100 litri per 10.000 m^2 di superficie. In relazione all'attrezzatura usata ed alla velocità di trasferimento, le concentrazioni possono essere aumentate, in ogni caso non superare la concentrazione del 1,5 %.

- **Trattamenti con termonebbiogeno (uso professionale):** utilizzare 50 ml di prodotto in 1 litro di Glicole propilenico o altro idoneo solvente. La soluzione ottenuta può essere usataper trattare circa 3500 m^3.

AVVERTENZE E **PRECAUZIONI D'USO**

Leggere attentamente le istruzione riportate sull'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. Il contenitore non può essere riutilizzato. Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare l'inalazione di fumi e vapori.

ORMA
Sede ORMA S.r.l. Via A. Chiribiri 2 Trofarello (TO) - 10028 Italia
T. +39 011 64 99 064 www.ormatorino.com