

## Masterbrody® Pasta

RODENTICIDA A BASE DI BRODIFACOUM 0,005%

Masterbrody® Pasta è il rodenticida in Pasta fresca a base di Brodifacoum. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a contrastare anche le infestazioni più critiche, anche in presenza di resistenza agli altri principi attivi, come il Bromadiolone.

E' efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. In formulazione pasta, è altamente appetibile per le specie di roditori indicate. Per le sue caratteristiche, non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.

Masterbrody® Pasta contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

Prodotto per uso professionale, è disponibile nel formato 10 Kg.

### UTILIZZATORE

Professionista formato

N° Registrazione:  
IT/2016/00327/AUT

### ORGANISMI TARGET



### COMPOSIZIONE

Brodifacoum puro 0,005 g  
Denatonio Benzoato 0,001 g

### FORMULAZIONE

Pasta 20 g

### FORMATO

10 Kg      Scatola

### TIPOLOGIA

Scatola

### CODICE


160-10

### IMBALLI

1 Pz.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Masterbrody® Pasta può essere usata all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza, sempre all'interno di erogatori di esca a prova di manomissione e protetti dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.



### MODALITÀ DI UTILIZZO

Masterbrody Pasta deve essere utilizzato secondo le seguenti indicazioni.

#### Usò all'interno di edifici - Per il controllo del:

- **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*) e **Ratto nero** (*Rattus rattus*): in caso di alta infestazione, posizionare 100 g di Masterbrody Pasta per contenitore, pari a 5 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuno. In caso di bassa infestazione, posizionare 60 g di Masterbrody® Pasta per contenitore, pari a 3 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuno.
- **Topolino Domestico** (*Mus musculus*): posizionare 40 g di Masterbrody Pasta per contenitore, pari a 2 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuno.



#### Uso all'esterno, intorno agli edifici - Per il controllo del:

- **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*) e **Ratto nero** (*Rattus rattus*): in caso di alta infestazione, posizionare 100 g di Masterbrody Pasta per contenitore, pari a 5 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuno. In caso di bassa infestazione, posizionare 60 g di Masterbrody Pasta per contenitore, pari a 3 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuno.
- **Topolino Domestico** (*Mus musculus*): posizionare 40 g di Masterbrody Pasta per contenitore, pari a 2 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuno.

Per l'applicazione di punti esca coperti e protetti in esterno, questi devono essere posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio.

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

## DA UTILIZZARE CON EROGATORI D'ESCA:

Esempi di Box erogatori di sicurezza ORMA:



Masterbox Midi  
(Cod. 137)



Masterbox Maxi  
(Cod. 136)



Total Box  
(Cod. 146)



Masterbox Plus  
(Cod. 243)

#### AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non disperdere nell'ambiente.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi con acqua e sapone.

Le esche devono essere disposte all'interno di adeguati contenitori con l'accesso solo per i roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di animali non bersaglio.