

REVISIONE 2026

## Rat Control® Pasta

RODENTICIDA A BASE DI BROMADIOLONE 0,005%

Rat Control® Pasta è il rodenticida in pasta fresca pronto all'uso, formulato con materie prime di alta qualità - farine di cereali, proteine, grassi, oli vegetali e zuccheri - per offrire un elevato livello di appetibilità per i roditori. Composto da Bromadiolone, è efficace già dopo una prima ingestione, con effetto ritardato dai 4 ai 10 giorni, contro Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti e Ratto nero (*Rattus rattus*) sia giovani che adulti. I bocconi di pasta da 20 g si presentano in carta alimentare, pronti da utilizzare, e si mantengono inalterati e conservano la loro morbidezza per tutta la validità di durata del prodotto. Inoltre, contiene amaricante per la riduzione del rischio di ingestione accidentale da parte di specie non target.

### UTILIZZATORE

Professionista formato

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Rat Control® Pasta può essere utilizzato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.



N° Registrazione:  
IT/2013/00108/AUT

### ORGANISMI TARGET



### COMPOSIZIONE

Bromadiolone puro 0,005 g  
Denatonio Benzoato 0,001 g

### FORMULAZIONE

Pasta 20 g

### FORMATO

5 Kg	Secchio
1,5 Kg	Busta
10 Kg	Scatola

### TIPOLOGIA

Secchio

### CODICE

130-05	Secchio	5 Kg
130-1.5	Busta	1,5 Kg
130-10	Scatola	10 Kg

### IMBALLI

1 Pz.	Secchio
12 Pz.	Busta
1 Pz.	Scatola

### MODALITÀ DI UTILIZZO

Rat Control® Pasta è un rodenticida indicato per utilizzo Professionale e secondo modalità di applicazione definite in etichetta e qui sintetizzate. Il prodotto deve essere utilizzato all'interno di appositi erogatori di esca (fissandola all'interno di questi) fissati al suolo o ad altre strutture così da mantenerli nel punto prestabilito ed al riparo da agenti atmosferici. Inoltre, i contenitori devono essere posizionati nei punti in cui si è valutato esserci il passaggio dei roditori, come camminamenti, nidi, tane, aperture ecc. Se l'intervento prevede l'utilizzo di più di un contenitore, questi devono essere posizionati ad una distanza minima tra uno e l'altro di 5 metri.



## DOSI E MODI D'IMPIEGO

### Uso all'interno di edifici - Per il controllo del:

- **Topolino Domestico** (*Mus musculus*): posizionare 40 g di Rat Control® Pasta per contenitore, pari a 2 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente, così da verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori.
- **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*) e **Ratto nero** (*Rattus rattus*): Posizionare 60-100 g di Rat Control® Pasta per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. Anche in questo caso, laddove fosse necessario installare più di un erogatore di esca, disporli ad una distanza minima tra loro di 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.

**Uso all'esterno, intorno agli edifici - Per il controllo del Topolino Domestico** (*Mus musculus*): posizionare 40 g di Rat Control® Pasta per contenitore, pari a 2 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori.

**Uso all'esterno, intorno agli edifici - Per il controllo del Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*) e **ratto nero** (*Rattus rattus*): posizionare 60-100 g di Rat Control® Pasta per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza minima tra loro di 5 metri. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

## DA UTILIZZARE CON EROGATORI D'ESCA:

Esempi di Box erogatori di sicurezza ORMA:



Masterbox Midi  
(Cod. 137)



Masterbox Maxi  
(Cod. 136)



Total Box  
(Cod. 146)



Masterbox Plus  
(Cod. 243)

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non disperdere nell'ambiente.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi con acqua e sapone.

Le esche devono essere disposte all'interno di adeguati contenitori con l'accesso solo per i roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di animali non bersaglio.