

REVISIONE 2026

Rat Shot® Block

RODENTICIDA A BASE DI DIFENACOUM 0,005%

Rat Shot® Block è un'esca rodenticida pronta all'uso in forma di blocco paraffinato, a base di Difenacoum (anticoagulante di seconda generazione), efficace contro *Mus musculus*, *Rattus norvegicus* e *Rattus rattus* anche dopo una singola ingestione. La formulazione paraffinata garantisce resistenza all'umidità e stabilità in ambienti difficili, rendendola idonea sia per impieghi interni che per postazioni esterne e aree aperte. Il prodotto incorpora Denatonio Benzoato come sostanza amaricante a tutela delle ingestioni accidentali, e non ingenera allarme nei roditori non ancora esposti all'esca. Indicato esclusivamente per operatori professionali nell'ambito di programmi IPM.

N° Registrazione:
IT/2018/00520/AUT

ORGANISMI TARGET



topi

ratti

COMPOSIZIONE

Difenacoum puro 0,005 g
Denatonio Benzoato 0,001 g

FORMULAZIONE

Blocchi 20 g

FORMATO

10 Kg Scatola

TIPOLOGIA

Scatola

CODICE

163-10

IMBALLI

1 Pz.

UTILIZZATORE

Professionista formato


CAMPI DI APPLICAZIONE

Rat Shot® Block può essere utilizzato all'interno di edifici e all'esterno intorno agli edifici, aree aperte.



MODALITÀ DI UTILIZZO

Prima del posizionamento di Rat Shot® Block, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione.



DOSI E MODI D'IMPIEGO

Uso all'interno di edifici - Topolino Domestico (*Mus musculus*): posizionare 40 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

Uso all'interno di edifici - Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*): in caso di alta infestazione, posizionare 60-100 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. In caso di bassa infestazione, posizionare 40-60 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

In caso di esche permanenti: posizionare 60-100 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento. Per l'utilizzo come esca permanente: ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al massimo ogni 4 settimane.

Uso all'esterno, intorno agli edifici - Per il controllo del:

- **Topolino Domestico (*Mus musculus*):** posizionare 40 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
- **Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*):** in caso di alta infestazione, posizionare 60-100 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. In caso di bassa infestazione, posizionare 40-60 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

In caso di esche permanenti: posizionare 60-100 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento. Per l'utilizzo come esca permanente: ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente. Per l'applicazione in punti esca coperti e protetti: per uso esterno, i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio. Non applicare il prodotto direttamente nelle tane.

In caso di utilizzo di "permanent baiting": il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. La strategia di "permanent baiting" deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione. In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

Uso all'esterno, aree aperte - Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*): in caso di alta infestazione, posizionare 60-100 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. In caso di bassa infestazione, posizionare 40-60 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

In caso di esche permanenti: posizionare 60-100 g di Rat Shot® Block per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia. Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento. Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non disperdere nell'ambiente.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi con acqua e sapone.

Le esche devono essere disposte all'interno di adeguati contenitori con l'accesso solo per i roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di animali non bersaglio.